SEZONOWE OFERTY PRODUCENTÓW

LIPIEC - SIERPIEŃ 2019

Oferta ważna od 1.07. do 31.08.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.

Nie dotyczy leków refundowanych

COLON SLIM proszek 300g
COLON MEN proszek 200g

COLON SLIM - suplement diety w proszku.
• Pomaga w utracie wagi (glukomannan) w ramach diety niskokalorycznej
• Pomaga redukować tkankę tłuszczową (melonowiec właściwy)
Suplement diety może być spożywany przez wegetarian i wegan.
Sposób użycia: 3 razy dziennie po 2 płaskie łyżeczki (4 g każda). Zmieszać ze szklanką płynu (np. wody, soku etc.) i wypić przed posiłkiem. Popić dodatkową porcją płynu. Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 3 g glukomannanu dziennie w trzech porcjach po 1 g każda, z 1 lub 2 szklankami wody, przed posiłkiem i w ramach diety niskokalorycznej. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Colon Slim przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 12-go roku życia.
COLON MEN - suplement diety w proszku.
• korzystnie wpływa na pracę jelit (łupina nasienna babki jajowatej psyllium)
• zawiera bakterie kwasu mlekowego (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis)
• wspomaga prawidłowe funkcjonowanie prostaty i dróg moczowych (ekstrakt z pestek dyni)
• wspomaga proces produkcji spermy (selen)
• wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (selen)
Suplement diety może być spożywany przez wegetarian i wegan.
Sposób użycia: 2 razy dziennie po 1 czubatej łyżeczce (5 g) przed posiłkami rano i wieczorem. Zmieszać ze szklanką płynu (np. wody, soku etc.) i wypić przed posiłkiem. Popić dodatkową porcją płynu. Łączna ilość przyjętego płynu na 5 g suplementu diety Colon Men nie powinna być mniejsza niż 250 ml. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Colon Men przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 12-go roku życia.
Podmiot odpowiedzialny: Orkla Care S.A.

SYLIMAROL® 70mg 30 tabl.

Na wątrobę.
Sylimarol® 70 mg
tabletka drażowana
Substancja czynna:
100 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego
(*Silybi mariani fructus extractum siccum*, 20-34:1).
Wskazania do stosowania:
Wspomagająco w stanach rekonwalescencji
po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby
spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin)
oraz w niestrawności (wzdęcia, odbijania) po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów. Wspomagająco w dolegliwościach
po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników lub na rośliny z rodziny Compositae/Asteraceae. Nie przeprowadzono badań odnośnie stosowania sylimaryny u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12. roku życia.
Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

CENTRUM® ENERGIA 30 tabl.

CENTRUM Energia x 30 tabletek
Centrum Energia to preparat multiwitaminowy, który pomaga zachować dobrą kondycję organizmu. Produkt oprócz kompozycji witamin i minerałów zawiera wyciągi z miłorzębu japońskiego i żeń-szenia, które wpływają korzystnie na witalność organizmu.
Działanie: Kompozycja witamin i minerałów uzupełniona wyciągami z żeń-szenia i miłorzębu japońskiego to prawdziwy zastrzyk cennych składników dla organizmu! Preparat multiwitaminowy Centrum Energia zawiera witaminy z grupy B – B1, B2, B6 i B12, które wraz z żelazem przyczyniają się do zachowania odpowiedniego metabolizmu energetycznego. Witamina B1 dodatkowo wspomaga funkcjonowanie serca. Witamina A, kwas askorbinowy, cynk, miedź i selen wspierają prawidłową pracę układu immunologicznego. Żelazo wraz z cynkiem wpływa na zachowanie prawidłowych funkcji poznawczych, a kwas pantotenowy wspiera utrzymanie sprawności umysłowej. Witamina D wspomaga pracę szkieletu mięśniowego.
Zastosowanie: Suplement diety Centrum Energia przeznaczony do stosowania w celu uzupełnienia diety w witaminy i minerały.
Informacje dodatkowe: Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.
Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.
Sposób użycia: Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Corporation Austria GmbH

SYSTANE® ULTRA krople do oczu 10 ml

SYSTANE® ULTRA - Wyrób medyczny.
Preparat polecany przy objawach suchego oka.
Przynosi ulgę w odczuwaniu pieczenia i podrażnienia spowodowanego suchością oka.
Nawilżające krople do oczu SYSTANE® ULTRA mogą być również używane do nawilżania lub przywracania wilgotności miękkich soczewek kontaktowych zmniejszając dyskomfort związany z ich noszeniem.
Dystrybutor: Alcon Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

BIOTEBAL® 30 / 60 tabl.



Biotebal (Biotinum). **Skład i postać:** Tabletki. 1 tabletka zawiera 5 mg biotyny. **Wskazania:** Niedobór biotyny. **Dawkowanie i sposób podawania:** Podanie doustne. Dawkowanie. Zwykle 5 mg na dobę. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. **Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności:** Produkt należy stosować regularnie. Produkt zawiera sorbitol (E 420) i dlatego nie należy go stosować, u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Działania niepożądane: W badaniach klinicznych stwierdzono pojedyncze przypadki zaburzeń żołądkowo–jelitowych i pokrzywki. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa; Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 14438 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa; tel.: +48 22 364 61 00; faks. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2017.07.28.

NUROFEN® EXPRESS FORTE 30 kaps.

NOWOŚĆ

Nurofen Express Forte, 400 mg, kapsułki, miękkie.
Każda kapsułka miękka zawiera 400 mg i
buprofenu (*Ibuprofenum*).
Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy przeznaczony jest do stosowania u dorosłych oraz dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (12 lat i starszych) w objawowym leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, bóle miesiączkowe, ból zębów oraz gorączka i ból związany z przeziębieniem.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną, czerwień koszenilową (E124) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związane z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy lub krwotok (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); ciężka niewydolność: wątroby, nerek lub serca (klasa IV wg NYHA); krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie; zaburzenia krzepnięcia lub skaza krwotoczna; niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego, ciężkie odwodnienie (wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów); ostatni trymestr ciąży; dzieci w wieku poniżej 12 lat oraz młodzież o masie ciała poniżej 40 kg.
Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

NERVOCALM SEN z melatoniną i melisą 20 tabl.

NervoCalm sen z melatoniną 1mg i melisą
Suplement diety
Suplement diety NervoCalm sen z melatoniną został stworzony z myślą o osobach mających trudności z zasypianiem i spokojnym snem, żyjących w napięciu nerwowym i dążących do uzyskania stanu wyciszenia w godzinach wieczornych i nocnych.
Skład zalecanej do spożycia porcji dziennej, zawartość w 2 tabletkach:
Ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego 400 mg, Ekstrakt z liści melisy lekarskiej 200mg,
L-teanina z liści zielonej herbaty 200mg, Ekstrakt z ziela męczennicy (passiflora) 20 mg, Melatonina 1 mg.
Ostrzeżenia do stosowania: Nie należy przekraczać zalecanej porcji preparatu do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy styl życia są istotne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Dostępne opakowania: Kartonik zawierający po 20 tabletek powlekanych po 762 mg.
Sposób użycia: 1 tabletka przed pójściem spać.
Producent: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

PIPI® NITOLIC®
zestaw, spray 30 ml

Pipi®Nitolic® Zestaw 50 ml przeznaczony do kompleksowego leczenia wszawicy wywołanej przez wesz głowową.
Zawartość opakowania:
1. Pipi®Nitolic® 50ml – spray do stosowania w celu leczenia wszawicy wywołanej przez wesz głowową.
2. Nitolic® nit remover 20 ml – emulsja rozpuszczająca cementowe spoiwo, ułatwia usuwanie martwych gnid z włosów.
3. Nitolic® Wash 20 ml – dodatek do prania przeznaczony do usuwania wszy głowowej oraz gnid a także wszy odzieżowej z tkanin, z którymi osoba zarażona miała kontakt, np.: ubrania bielizna pościel, koce narzuty itp.
4. Grzebień Nitolic® – gęsty grzebień służący do wyszukiwania owadów w celach diagnostycznych oraz usuwania martwych wszy i gnid po wykonanym zabiegu.
5. Czepek Nitolic
6. Lista kontaktów
7. Książeczka „Problem z głowy", dzięki której można umilić dziecku czas pod czas stosowania Pipi®Nitolic® oraz wyjaśnić mu, że problem wszy nie jest tak straszny, jak się może wydawać.
Pipi®Nitolic® 30ml wyrób przeznaczony do stosowania w leczeniu wszawicy wywołanej przez wesz głowową.
Zalety preparatu
- Jednorazowa aplikacja – bez konieczności wykonywania powtórnego zabiegu
- Likwiduje aktywne stadia rozwojowe wszy
- Likwiduje jaja wszy (gnidy)
Zawartość opakowania: Pipi®Nitolic® 30ml - spray do stosowania w celu leczenia wszawicy wywołanej przez wesz głowową.
Producent: ICB PHARMA

MAGNE B6® 50 tabl.
MAGNE B6® FORTE 60 tabl.

MAGNE B6®, 48 mg jonów magnezu + 5 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki powlekane. Każda tabletka powlekana zawiera 48 mg jonów magnezu (1, 97 mmol) w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego (*Magnesii lactas dihydricus*) i 5 mg pirydoksyny chlorowodorku (*Pyridoxini hydrochloridum*). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza 330,569 mg.
Magne B6® Forte, 100 mg jonów magnezu + 10 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki powlekane. Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu (*Magnesii citras*) i 10 mg pirydoksyny chlorowodorku (*Pyridoxini hydrochloridum*). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza 50,57 mg. **Wskazania do stosowania:** Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu: - nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu; - objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca); - kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek. Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy. W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magne B6, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane. **Sposób podawania:** Tabletki należy połykać popijając dużą ilością wody. **Do stosowania wyłącznie u dorosłych oraz dzieci w wieku 6 lat lub powyżej.** Dostępne są inne postaci produktu leczniczego, odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6 lat. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), jednoczesne stosowanie lewodopy.
Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.
Informacji udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., tel.: 22 280 00 00. Pozwolenie Prezesa URPLWMiPB na dopuszczenie do obrotu nr: 4279. (ChPL 02/2016)

OSŁONIK® MAX
EXTRA - 20 kaps.
JUNIOR - 10 sasz.

OSŁONIK® MAX extra kapsułki 20 sztuk, **OSŁONIK® MAX junior** saszetki 10 sztuk
Osłonik® Max to suplement diety. Zawarte w Osłonik Max szczepy bakterii działają wspomagająco w:
• trakcie i po antybiotykoterapii
• chorobach przewodu pokarmowego przebiegających z biegunką
Osłonik® Max to symbiotyk zawierający w składzie: Lactobacillus rhamnosus GG – 2 x 10^9 jtk; Saccharomyces boulardii – 2 x 10^9 jtk; Inuline – 200 mg (jtk – jednostka tworząca kolonie). Teraz w formie MIKROKAPSUŁKOWANEJ zapewniającej zachowanie wysokiej aktywności biologicznej bakterii podczas przechowywania produktu oraz jego przyjmowania.
Osłonik® Max (extra i junior) jest przeznaczony dla: wszystkich grup wiekowych; niemowląt, dzieci i dorosłych (kapsułki od 3 roku życia); nie zawiera laktozy; nie wymaga przechowywania w lodówce; wygodna postać preparatu: saszetki lub kapsułki
Producent: Polfa Tarchomin S.A.

KICK THE TICK®
repelent spray 200 ml

KICK THE TICK® Max Repelent Plus, produkt biobójczy.
Spray w ekonomicznym opakowaniu, który skutecznie chroni przed kleszczami, komarami i meszkami. Trójskładnikowa formuła działa odstraszająco na owady i kleszcze oraz zakłóca ich receptory czuciowe. Zapewnia skuteczną do ochronę do 4 godzin. Można stosować go u dzieci od 3-go roku życia. Nie zawiera DEET. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną. Pojemność 200 ml.
Dystrybutor: ICB Pharma.

Informacje na temat preparatów prezentowanych w informatorze: tel. 71 715 62 81. Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej zgodnie z art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i innych stosownych przepisów. Dołożono wszelkich starań aby uniknąć ewentualnych błędów. Informator wydany na zlecenie producentów przez Halo–Farm, halo.kontakt@gmail.com

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

uroFuraginum

Działa już od pierwszego dnia!

ADAMED GROUP

Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: uroFuraginum (Furazidinum, poprzednio stosowana nazwa: furagina). Dawka substancji czynnej: 1 tabletka zawiera 50mg furaginy. Postać farmaceutyczna: Tabletki niepowlekane. **Wskazania:** zakażenie dolnych dróg moczowych. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, I trymestr ciąży, w okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka, dzieci w wieku do 3 miesięcy, niewydolność nerek z klirensem kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy, rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. **Opakowanie:** Opakowanie zawiera 30 tabletek. **Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Consumer Healthcare S.A., Pienkow 149, 05-152 Czosnów.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

PROFICAR

Ochrona serca w najkorzystniejszej cenie!*

OTC/0199/02/18

ADAMED GRUPA

* wg danych Kamsoft cena sprzedaży do pacjenta 09.2017 w kategorii leków z kwasem acetylosalicylowym stosowanych w ochronie serca

Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: Proficar (Acidum acetylsalicylicum) Dawka substancji czynnej: Jedna tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego. **Postać farmaceutyczna:** Tabletka dojelitowa. **Wskazania do stosowania:** Hamowanie agregacji płytek krwi: w chorobie niedokrwiennej serca, w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca, w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG), po przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyce wieńcowej (PTCA), w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki. **Przeciwwskazania:** Produktu leczniczego nie wolno stosować: w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, u pacjentów ze skazą krwotoczną, z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, z ciężką niewydolnością nerek, ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością serca, z napadami astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, w ostatnim trymestrze ciąży, u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reyea rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu. **Opakowanie:** 1 opakowanie zawiera 60 tabletek dojelitowych. **Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

HITAXA FAST

Lek przeciwalergiczny II generacji - niewywołujący senności*

HIS/0332/02/19

ADAMED GRUPA

* Hitaxa Fast jest lekiem przeciwalergicznym nie wywołującym senności. Zgodnie z CHPL w kontrolowanych badaniach klinicznych po podaniu zalecanej dawki 5 mg na dobę, senność występowała nie częściej niż w grupie placebo (pkt. 5.1 CHPL). Po wprowadzeniu produktu do obrotu bardzo rzadko obserwowano senność (pkt. 4.8 CHPL – działania niepożądane).

Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: Hitaxa fast (*Desloratadinum*); Hitaxa Fast junior (*Desloratadinum*). **Dawka substancji czynnej:** Hitaxa Fast: każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg desloratadyny; Hitaxa Fast junior: każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2,5 mg desloratadyny. **Postać farmaceutyczna:** Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej. **Wskazania do stosowania:** Produkty Hitaxa Fast, Hitaxa Fast junior są wskazane w celu łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką. **Przeciwwskazania:** Produkty Hitaxa Fast, Hitaxa Fast junior: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę. **Opakowanie:** Produkty Hitaxa Fast, Hitaxa Fast junior: 10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. **Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

CONTROLOC® Control

14 tabletek

CONTROLOC Control® 20 mg
Skład: 1 tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).
Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie inhibitorów proteazy HIV, których wchłanianie zależy od pH kwasu solnego w żołądku, takich jak atazanawir czy nelfinawir jednocześnie z pantoprazolem jest przeciwwskazane z powodu znacznego ograniczenia ich biodostępności przez pantoprazol.
Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH., Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 Konstanz, Niemcy.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

VOLTAREN® EXPRESS FORTE

20 kapsułek miękkich

Voltaren Express Forte
Diklofenak potasu 25 mg. Kapsułki miękkie.
Wskazania do stosowania:
Voltaren Express Forte stosuje się w bólach mięśni, bólach reumatycznych, ostrym bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej (ból pleców), bólu głowy, bólu zębów, bolesnym miesiączkowaniu. Leczenie objawów grypy i przeziębienia (bóle uogólnione, gorączka), bólu gardła.
Przeciwwskazania:
- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego.
- Występujące w przeszłości krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja, związane z wcześniejszym leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Czynna lub występująca w przeszłości nawracająca choroba wrzodowa i (lub) krwawienie (wystąpienie dwóch lub więcej odrębnych przypadków potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).
- Trzeci trymestr ciąży.
- Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.
- Stwierdzona zastoinowa niewydolność serca (klasa II–IV wg NYHA), choroba niedokrwienna serca, choroba naczyń obwodowych i (lub) choroba naczyń mózgowych.
- Podobnie jak w przypadku innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub pochodnych kwasu acetylosalicylowego, stosowanie diklofenaku jest przeciwwskazane u pacjentów, u których podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych leków hamujących syntezę prostaglandyn może być przyczyną wystąpienia napadu astmy, pokrzywki lub ostrego nieżytu błony śluzowej nosa.

Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.IX.2016

HEVIPOINT

Lek przeciw opryszczce wargowej w dwóch formach: tabletek i sztyftu

HEV/0327/01/19

ADAMED GRUPA

Hevipoint
Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: HEVIPOINT 50mg/g sztyft na skórę; Hevipoint, 200 mg, tabletki (Aciclovirum). **Dawka substancji czynnej:** jeden gram sztyftu na skórę zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum); każda tabletka zawiera 200 mg acyklowiru (Acyclovirum). **Postać farmaceutyczna:** sztyft na skórę; tabletki. **Wskazania:** HEVIPOINT sztyft na skórę - produkt leczniczy HEVIPOINT jest wskazany w leczeniu zakażenia warg wirusem opryszczki zwykłej Herpes simplex (nawracającej opryszczki wargowej) u dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Hevipoint tabletki - Leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych. Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej. **Przeciwwskazania:** HEVIPOINT sztyft na skórę, Hevipoint tabletki: nadwrażliwość na acyklowir, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. HEVIPOINT sztyft na skórę: Dzieci w wieku poniżej 12 lat. **Opakowanie:** HEVIPOINT sztyft na skórę: pojemnik zawierający 3 g sztyftu na skórę; Hevipoint tabletki: opakowanie zawiera 30 tabletek. **Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

NOWOŚĆ

GARDAN

LEK NA BÓL O DUŻYM NASILENIU I GORĄCZKĘ

GAR/0278/08/18

ADAMED GRUPA

GARDAN - Dawka substancji czynnej lub stężenie substancji czynnej: każda tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego. **Postać farmaceutyczna:** Tabletka. **Wskazania do stosowania:** produkt przeznaczony do stosowania u dorosłych w bólach różnego pochodzenia o dużym nasileniu, gorączce. Produkt wskazany w sytuacji, gdy stosowanie innych leków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na metamizol sodowy lub inne pochodne pirazolonu, lub którąkolwiek substancję pomocniczą; astma wywołana lub zaostrzona przez niesteroidowe leki przeciwzapalne; reakcje nadwrażliwości na jakikolwiek niesteroidowy lek przeciwzapalny lub przeciwbólowy, w szczególności objawiające się obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, nieżytem nosa; ostra porfiria wątrobowa; wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek; choroby hematologiczne, w tym niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza i leukopenia, ciąża i laktacja. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 18 lat. **Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Pharma S.A., Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

MULTI-SANOSTOL®

syrop 600 g

MULTI-SANOSTOL®
Wielowitaminowy preparat dla dzieci (od 1 roku życia), z dodatkiem wapnia, syrop, produkt złożony.
Wskazania: zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy, utrata apetytu, skłonność do częstych infekcji, okres wzrostu i rozwoju, stany wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz przemęczenie, obniżona zdolność koncentracji, okres rekonwalescencji po przebytych chorobach oraz antybiotykoterapii, w celu poprawy ogólnej kondycji organizmu. Produkt może być podawany dzieciom powyżej 1 roku życia, a także młodzieży i dorosłym.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu, zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), zwiększone wydalanie wapnia z moczem (hiperkalcynuria), zwiększone stężenie Wit. A lub D (hiperwitaminoza A lub D). Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu. **Opakowanie:** 600g
Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

COREGA® SUPER MOCNY

krem mocujący 40 g / 70 g

° Zapewnia trwałość umocowania protezy przez cały dzień.
° Posiada naturalny smak.
Specjalna formuła kremu Corega® Super Mocny Delikatnie Miętowy zapewnia trwałe umocowanie protezy przez cały dzień bez ryzyka podrażnienia wrażliwych dziąseł.
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare sp. z o.o.

B12 MAX

60 tabl.

B12 MAX
suplement diety
WYSOKA ILOŚĆ WITAMINY B12 W MAŁEJ, ŁATWEJ DO POŁKNIĘCIA TABLETCE
60 tabletek
Bardzo wysoka ilość witaminy B12 w małej, łatwej do połknięcia tabletce. Witamina B12 pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Homocysteina jest czynnikiem determinującym stan układu sercowo-naczyniowego. Witamina B12 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, prawidłowych funkcji psychologicznych oraz zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Pomaga również w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i odpornościowego.
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ

CALCIUM ALERGO PLUS®

16 tabl. mus.

Laboratoria PolfaŁódź
Calcium Alergo Plus. Suplement diety.
Wapno na alergię
Jedyny preparat z unikalną formułą Triple Action
- Wysoko przyswajalny mleczan wapnia
- Synergia działania (wapń + cynk + kwercetyna)
- Smak pomarańczowy

Wapno CALCIUM ALERGO PLUS zawiera FORMUŁĘ TRIPLE ACTION, która dzięki optymalnym proporcjom poszczególnych składników wzmacnia siły obronne organizmu. Wapń pomaga w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa nerwowego. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Kwercetyna jest związkiem z grupy flawonoidów. Wapń i cynk biorą udział w procesie podziału komórek.
Sposób stosowania: Zalecana dzienna porcja do spożycia – 2 tabletki dziennie. Tabletkę rozpuścić w połowie szklanki letniej wody. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Istotne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Spożycie zalecanej dziennej porcji produktu zapewnia deklarowany efekt dla zdrowia.
Zawartość opakowania: 16 tabletek musujących
Podmiot odpowiedzialny: Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.

VITA BUERLECITHIN®

1000 ml

VITA BUERLECITHIN®, płyn doustny, produkt złożony.
Wskazania: osłabienie pamięci i koncentracji, stany stresowe, nadpobudliwość nerwowa, bezsenność, stany wyczerpania fizycznego i psychicznego (przepracowanie, wyczerpanie, szybkie męczenie się), pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym, objawy niedoboru witamin z grupy B, stan rekonwalescencji po przebytej chorobie, pomocniczo u osób w podeszłym wieku, zapobiegawczo w miażdżycy naczyń, zapobiegawczo i pomocniczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne, orzechy, soję lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u osób z zespołem przeciwciał antyfosfolipidowych. Ze względu na zawartość alkoholu produktu Vita Buerlecithin płyn nie stosować u: dzieci w wieku poniżej 12 lat, kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób ze schorzeniami wątroby, padaczką, chorobą alkoholową, uszkodzeniami mózgu. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.
Opakowanie: 1000 ml.
Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Doppelherz® aktiv

MAGNEZ B6 CYTRYNIAN

30 tabl.

Doppelherz aktiv Magnez-B6 Cytrynian to produkt zawierający wysoce przyswajalny magnez w postaci cytrynianu wzbogacony o witaminę B6. Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w utrzymaniu prawidłowego utrzymania funkcji psychologicznych a ponadto wspomaga prawidłowy metabolizm energetyczny.
Magnez przyczynia się do właściwego funkcjonowania mięśni i zachowania równowagi elektrolitowej.
Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.
Zalecane spożycie: stosować 1 kapsułkę dziennie po posiłku, popijając wodą.
Producent: Queisser Pharma

1 Sudafed® XyloSpray HA zawiera 3 substancje o działaniu nawilżającym [illegible]

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

1. Dotyczy Nasivin Classic. Charakterystyka produktu leczniczego Nasivin Classic, data zatwierdzenia 27.12.2016r.
2. W porównaniu z roztworem soli fizjologicznej.

Skrócona informacja o leku: Nasivin® Baby, Nasivin® Kids i Nasivin® Classic. Skład i postać farmaceutyczna: Nasivin® Baby krople do nosa, roztwór. 1 ml roztworu zawiera 0,1 mg oksymetazoliny chlorowodorku. [illegible]

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

CALCINEFF 120 tabletek

- węglan wapnia 1000 mg w tabletkach
- opakowanie 120 tabletek
- podzielna tabletka
- promocyjna cena
- polski produkt na kieszeń
- więcej na: www.calcineff.pl

Producent: Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Sp. z o.o. (dawniej Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy Labor) ul. Długosza 49, 51-162 Wrocław

ORTON FLEX

30 kapsułek lub 30 saszetek

Orton Flex kapsułki.
Suplement diety. Orton Flex – aż 6 składników dla sprawnych stawów.
Orton Flex to preparat specjalnie opracowany z myślą o osobach, które chcą kompleksowo zadbać o swoje stawy. Dzięki kompozycji aż 6 składników tj.: kolagen, kwas hialuronowy, glukozamina, chondroityna, ekstrakt z imbiru oraz witamina C, Orton Flex kompleksowo wspomaga zachowanie sprawnych stawów. [illegible]
Producent: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.