

Nie dotyczy leków refundowanych

PADUDEN
EXPRESS
200 mg
20 tabletek 200 mg

PADUDEN
EXPRESS FORTE
400 mg
20 tabletek 400 mg

[illegible]

Dystrybutor: Orkla Care S.A., ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

MÖLLER'S SUPLEMENT DIETY
NORWESKI SPOŚÓB NA WSPARCIE ZDROWIA
I ODPORNOŚCI CODZIENNE

NOWOŚĆ 150 ml

Codzienna dawka OMEGA-3 i witaminy D.

SUPLEMENT DIETY

KETONAL® ACTIVE

10 / 20 / 30 kaps.

Sila BEZ RECEPTY!

Ketonal® Active, 10 i 20 kapsulek

Skład: Jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 186,10 mg laktozy jednowodnej.

Wskazania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe, kostno-stawowe, ból głowy.

Przeciwwskazania: Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego, ASA) lub innych NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji anafilaktycznych. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. Postać: kapsułki twarde, 50mg

Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.

Podmiot promujący: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl.

Sygnatura: KETO/011/01-2019

*Na podstawie badania TNS Kantar – postrzeganie marki Ketonal maj 2018; <http://www.ketonalactive.pl/Informacje-o-leku/>

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.



ASECURIN GASTRO

20 kaps.



ASECURIN GASTRO

Miliardy korzyści dla zdrowych jelit

Asecurin GASTRO to połączenie specjalnie wybranych szczepów bakterii probiotycznych z rodnymi *Lactobacillus* i *Bifidobacterium* oraz drożdży *Saccharomyces boulardii*, które w naturalny sposób uzupełniają mikroflorę jelitową. Produkt zawiera aż 25 mld AFU*. Dzięki zastosowaniu kapsulek celulozowych, które są odporne na soki żołądkowe probiotyki dociera bezpośrednio do miejsca przeznaczenia, czyli do jelit.

*AFU – aktywne jednostki fluorescencji

Podmiot odpowiedzialny: Afofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

SUPLEMENT DIETY

ACC® OPTIMA

10 tabl. musujących



ACC® Optima tabletki musujące.

ACC® Szybki sposób na kaszle!

Wskazania: lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, czynna choroba wrzodowa, ostry stan astmatyczny. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Skład: 1 tabletki musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny.

Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria

Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa

Sygnatura: ACC OTC/041/08-2022

*ACC rozcina zalegającą wydzielinę – przyczynę kaszlu mokrego – ułatwiając jej odkrztuszanie. 1) ChPL ACC Optima 2) Krenke R, Chorostowska – Wyimko J, Dąbrowska M. Postępowanie w kaszlu u osób dorosłych – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych, Lekarz POZ. 2018;4(6):425-452. 3) Bellomo G, Giudice S. Controlled study on the efficacy of a combination "thiamphenicol-acetylcysteine" in oral administration in respiratory infections in pediatrics, Pediatrics 1972; 54:30-51 4) Zaitseva OV. Rational choice of mucolytic therapy in treatment of respiratory diseases in children. RMJ. 2009; 17(19):1217-1221.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Działa SZYBKO i DŁUGO*1



DOSTĘPNY
RÓWNIEŻ:



**Chlorek cetylopirydyniowy
ELIMINUJE PRZYCZYNY
INFEKCJI (wirusy i bakterie)**

**Benzydamina
ZMNIEJSZA STAN ZAPALNY**

**Benzydamina
SZYBKO ŁAGODZI BÓL**



*1) Już po 15 min. i przez 3 godziny.

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Septolette ultra o smaku cytryny i miodu oraz smaku eukaliptusowym 3 mm + 1 mg, tabletki twarde.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

AMOL®

100 / 150 / 250 ml



Amol, produkt złożony, płyn doustny, płyn na skórę. Zawiera 67% v/v etanolu.

Wskazania do stosowania: Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Amol stosowany jest tradycyjnie w następujących wskazaniach: zewnętrznie: w celu poprawy złego samopoczucia np. w przebiegu przeziębienia, w bólach głowy, bólach mięśniowych; w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów; wewnętrznie: w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych) np. wzdęcia i niestrawność.

Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare A/S, Energievej 15, 5260 Odense S, Dania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

FebriSan

UWALNIA
OD 7 OBJAWÓW PRZEZIĘBIENIA

■ KATAR, GÓRĄCZKA I DRESZCZE
■ BÓL GARDŁA, GŁOWY, MIĘŚNI I ZATOK

STAWIA NA NOGI

FebriSan, (750 mg + 60 mg + 10 mg)/5 g, proszek musujący. Jedna szaszetka (5 g proszku musującego) zawiera 750 mg paracetamolu (Paracetamol), 60 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) i 10 mg fenylefryny chlorowodoru (Phenylephrin hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanych działaniach. Jedna szaszetka zawiera 2458 mg sacharozy (w tym sacharoza pochodząca z aromatu), 110 mg aspartamu (E951), 85 mg glukozy (składnik aromatyczny), oraz 156 mg sodu (w tym sól pochodzący z sodu wodorowęglanu, żółcieni chiniolowej i aromatu).

Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka, dreszcze, ból głowy, ból mięśni, ból gardła, katar, ból zatok.

Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare A/S, Energievej 15, 5260 Odense S, Dania

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

BIOVITAL® 1000 ml



Biovital ZDROWIE plus. Suplement diety. 1000ml
Zawiera mikro-kapsułkowane ŻELAZO o dobrej przyswajalności, które NIE BARWI UZBIENIA
- zwiększa dopływ tlenu oraz poprawia ukrwienie i odżywienie organizmu ekstrakt z owoców GLOGU
- przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia i odczucia stresu (ŻELAZO)
- pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu homocysteiny – ZDROWIE SERCA I NACZYŃ KRWIŃNOŚNYCH (KWAS FOLIOWY)
- chroni przed wolnymi rodnikami (WITAMINY C I E)
Skład: Gęsty ekstrakt z owoców GLOGU, Mikro-kapsułkowane ŻELAZO, KWAS FOLIOWY, Witamina B1 (tiamina), Witamina B2 (ryboflawina), Witamina B3 (niacyna), Witamina B6, Witamina C, Witamina E.

Biovital PAMIĘĆ. Suplement diety. 1000 ml
Zawiera unikalne połączenie ekstraktów z trzech roślin: Ginkgo biloba, Bacopa monnieri i Gotu kola, które WSPOMAGAJĄ POPRAWĘ UKRWIENIA I DOTLENIENIA MÓZGU.
- wspomaga krążenie mózgowe, pomaga utrzymać sprawność umysłu wraz z upływem czasu (GINKGO BILOBA)
- zmniejsza uczucie zmęczenia i zmęczenia, wpływa na prawidłową pracę układu nerwowego (WITAMINY Z GRUPY B: ryboflawina, niacyna, B6, B12)
- pomaga chronić komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników (WITAMINA E)
- ma wysoką przyswajalność bio-aktywnych składników, dzięki płynnej formie podania
Skład: Wyciąg z liści Ginkgo Biloba (miorazbu japońskiego), wyciąg z liści Bacopa monnieri, wyciąg z ziela Gotu Kola (warkroły azjatyckiej), Witamina E, Witamina B6, Ryboflawina, Witamina B12, Kwas pantotenowy, Niacyna

Podmiot wprowadzający na rynek:
EGIS Pharmaceuticals PLC, Keszetrut ul. 30-38,
1106 Budapest, Węgry
Reprezentowany w Polsce przez: EGIS Polska Sp. z o.o.,
ul. Komitetu Obrony Robotników, 62-146 Warszawa

bioital® COMPLEX ON COMPLEX ONA

30 / 60 kapsułek

Biovital Complex ON - suplement diety
Biovital Complex to połączenie witamin i mikroelementów szczególnie rekomendowane mężczyznom pracującym i przemęczonym, chcącym zachować odporność i energię, aby wspomóc prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
Dodatkowo wzbogacony standaryzowanym ekstraktem z żeń-szenia.

Biovital Complex ONA - suplement diety, witaminy i minerały, jest preparatem przeznaczonym dla kobiet, stanowi kompleks witamin i mikroelementów wzbogaconych olejem z wiesiołka. Dzięki zawartości biotyny, żelaza, cynku, niacyny i ryboflawiny pomaga zachować zdrową skórę oraz utrzymać prawidłowy metabolizm węglowodanów.



FORTILIVER FORTE 30 kaps.



Fortiliver forte
suplement diety, 30 kapsułek

WZMOCNIENIE I OCHRONA WĄTROBY

Fortiliver forte to suplement diety zawierający wysokiej jakości fosfolipidy naturalnego pochodzenia, z lecytyny sojowej. 1 kapsułka Fortiliver forte zawiera 420 mg fosfolipidów (Phospholipidum essentiale).
Stosowanie Fortiliver forte jest polecane jako uzupełnienie diety w fosfolipidy.

- w okresie stosowania, ciężkostrawnej diety
- w okresie narażenia na ciężłe sytuacje stresowe
- w okresie przyjmowania dużej ilości leków
- w sytuacji przeciążenia wątroby alkoholem
- w okresie przemęczenia

Ważna informacja: produkt dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12. lat. Przed zastosowaniem w okresie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.
Fosfolipidy są pozyskiwane z soi, dlatego nie są one zalecane osobom z alergią na soję i jej przetwory.
Wyprodukowano dla: Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa

XEDINE HA 0,5 mg/ml 1,0 mg/ml

Xedine HA dla dzieci, 0,5 mg/ml, aerosol do nosa, noszcie.

Xedine HA, 1 mg/ml, aerosol do nosa, noszcie.

LECZY, NAWILŻA I OCZYSZCZA BŁONĘ ŚLIZOWĄ NOSA

Xedine HA to lek, który dzięki optymalnej kompozycji: chlorowodoru ksymentolenu, kwasu hialuronowego i wody morskiej, ma znaczący wpływ na błonę śluzową nosa. Szybko działa, a efekt utrzymuje się aż do 10 godzin. Bezpieczny lek dla całej rodziny o delikatnym działaniu na błonę śluzową nosa, bez efektu przesuszania, w wygodnej do podania formie - aerozolu.

Skład: Xedine HA dla dzieci, 0,5 mg/ml, jeden ml zawiera 0,5 mg ksymentolenu chlorowodoru.

Xedine HA dla dorosłych, 1 mg/ml, jeden ml zawiera 1 mg ksymentolenu chlorowodoru.

Skład: Xedine HA, 1 mg/ml, jeden ml zawiera 1 mg ksymentolenu chlorowodoru.

Wskazania: Objawowe leczenie przewlekłego błony śluzowej nosa spowodowanego zapaleniem błony śluzowej nosa lub zapaleniem zatok. Xedine HA dla dzieci 0,5 mg/ml jest wskazane do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 12 lat.

Wskazania: Objawowe leczenie przewlekłego błony śluzowej nosa spowodowanego zapaleniem błony śluzowej nosa lub zapaleniem zatok. Xedine HA 1% (o mocy 1 mg/ml) przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksymentolenu chlorowodoru lub na którekolwiek substancje pomocnicze, stan po przebiegłym udarze mózgu.

ASPARAGINIAN EXTRA

50 tabl.

ASPARAGINIAN EXTRA

suplement diety

Preparat przeznaczony dla osób dorosłych w stanach zwiększonego zapotrzebowania organizmu na magnez i potas. Dzięki swoim składnikom przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania serca, układu krążenia i mięśni oraz w stanach stresu i zmęczenia.

Działania składników zawartych w preparacie:

Przy skurczach łydek, stępi innych mięśni

• magnez – wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym łydek i stóp;

• potas – uczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,

w tym w mięśniach;

• tiamina – współuczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,

w tym w mięśniach.

W stanach stresu oraz zmęczenia

• magnez – pomaga w zmniejszeniu uczucia zmęczenia;

• kwas pantotenowy – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i zmęczenia;

• tiamina – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

Ciąnienie krwi i układ krążenia

• potas – pomaga w utrzymaniu właściwego ciśnienia krwi;

• magnez – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, w tym mięśnia sercowego;

• tiamina – wspiera prawidłową pracę serca.

Sprawność umysłowa

• kwas pantotenowy – pomaga w utrzymaniu dobrej sprawności umysłowej;

• tiamina – pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych;

• cynk – pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych i dobrego widzenia.



ENTEROLACTIS® Plus

15/ 30 kaps.

ENTEROLACTIS® Plus, kapsułki, suplement diety zawierający żywe bakterie szczepu L. casei D98 (Lactocaseibacillus paracasei D98® H1572, DSM 34154). Szczep ten charakteryzuje się dużą przetrwalnością oraz przyczepnością (adhezją) do komórek błony śluzowej jelit. L. casei D98® (Lactocaseibacillus paracasei D98® H1572, DSM 34154) to unikatowy, opatentowany szczep bakterii, który jest zdeponowany w Instytucie Pasteura w Paryżu w CNCM (Collection Nationale de Cultures de Microorganismes) pod numerem CNCM I-1572.

SPOSÓB UŻYCIĄ: dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 1 kapsułka dziennie, popijając wodą, najlepiej na pusty żołądek; w przypadku jednoczesnego stosowania terapii antybiotykowej, Enterolactis należy przyjmować co najmniej 3 godziny po antybiotyku; może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

OSTRZEŻENIA: Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety; należy stosować zbilansowaną i zróżnicowaną dietę oraz prowadzić zdrowy tryb życia; nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia; nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu.

SKŁADNIKI: L. casei D98® (Lactocaseibacillus paracasei D98® H1572, DSM 34154), nie mniej niż 24 miliardy CFU, hydroksypropylometyloceluloza (otoczka kapsułki), barwnik, węglan wapnia (E170), substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu; sole magnezowe kwasów tłuszczonych; nie zawiera glutenu i laktozy, produkt odpowiedni dla wegan.

Wyprodukowano we Włoszech dla Alfaisigma Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

NervoCalm KIDS Spokój

30 żelków

NOWOŚĆ



NervoCalm KIDS Spokój to suplement diety dla dzieci powyżej 6. roku życia w formie pysznych żelków o smaku malinowym bez dodatku cukru.

Zawiera dwa roślinne składniki aktywne: 8,6 mg wyciągu z ziela melisy lekarskiej i 5 mg wyciągu z szyszek chmielu zwyczajnego oraz 1,4 mg witaminy B6 – w porcji dziennej (1 żelek). Bez dodatku cukru (zawiera naturalnie występujące cukry). Bez barwników i substancji konserwujących. Odpowiedni dla wegan.


Zalecana dzienna porcja niezbędna do uzyskania korzystnego działania: 1 żelek.

Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEKAM Sp. z o.o.

SUPLEMENT DIETY

Zatogrip NOC 3+

płyn 120 ml



ZATOGRIPOC 3+ to suplement diety w postaci płynu o smaku malinowym zawierający 4 ekstrakty roślinne: z korzenia prawoślazu, z kwiatów lipy, z kwiatów rumianku i z szyszek chmielu. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia. Zawiera substancję słodzącą.

SKŁADNIKI substancja słodząca - syrop sorbitolowy; woda; ekstrakt z kwiatów lipy (*Tilia platyphyllos* Scopoli); ekstrakt z kwiatów rumianku (*Matricaria recutita* L.); ekstrakt z korzenia prawoślazu (*Althaea officinalis* L.); regulator kwasowości - kwas cytrynowy; naturalny aromat malinowy; ekstrakt z szyszek chmielu (*Humulus lupulus*).

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE Dzieci powyżej 3 roku życia: 1 miarka (10 ml) 30 minut przed zaśnięciem.

OSTRZEŻENIA Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEKAM Sp. z o.o.

SUPLEMENT DIETY

MAGLEK B6 FORTE

60 tabl.



Maglek B6 Forte (*Magnesium citras, Pyridoxini hydrochloridum*) 1 tabletki powlekane Maglek B6 Forte zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu (*Magnesium citras*) oraz 10 mg pyrydoksyny chlorowodoru (*Pyridoxini hydrochloridum*).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 62,22 mg.

Wskazanie do stosowania leku Maglek B6 Forte stanowi uzupełnienie stwierdzonych niedoborów magnezu w organizmie. Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu: nerwowość, wahania nastroju, łagodny lek, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu; objawy leku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca); kurcze mięśni, mrowienie, drżenie powiek. Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy. Produkt należy stosować po wykluczeniu innych przyczyn objawów niż niedobór magnezu oraz gdy osiągnięcie poprawy lub zwiększenie podaży magnezu nie jest możliwe przez zastosowanie prawidłowej diety. W przypadku braku poprawy po miesięcznym stosowaniu produktu leczniczego Maglek B6 Forte kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.

Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEKAM Sp. z o.o.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

MELATONINA LEK-AM 5 mg

90 tabl.

Do wyspanych świat należy

- Ułatwia zasypianie¹
- Poprawia jakość snu¹
- Nr 1 na sen w Polsce²

Melatonina nie uzależnia³



Melatonina LEK-AM (*Melatoninum*) Jedna tabletki Melatoniny LEK-AM (*melatoninum*), zawiera 1 mg, 3 mg lub 5 mg melatoniny. Wskazana jest jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Lek ułatwia także regulację zaburzeń dobowego rytmu snu i czuwania u pacjentów niewidomych. Melatoniny nie należy stosować po spożyciu alkoholu oraz w okresie ciąży lub laktacji. Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEKAM Sp. z o.o. Kod: MEL/23/04/28/W1

1 - CHPL Melatonina LEKAM 17.02.2022

2 - IQVIA Poland National Sales Data for the period 10/2022; OTC4: 13A3C Sleeping product – Capsules, MAT 10/2022; Units & Values reflecting estimates of real-world activity. Copyright IQVIA. All rights reserved

3 - Leczenie bezsenności u osób w wieku od 55 lat: A. Wichniak, *Wiadomości Lekarskie* 2019; 74(5):114-15

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

ZATOGRIPOC

jedyny o takim składzie działający na każdym etapie infekcji!



* dotyczy dżemu tj. syropów

BABY 1+ syrop dla dzieci powyżej 1 roku życia syrop 120 ml

KIDS 3+ syrop dla dzieci powyżej 3 roku życia syrop 120 ml

JUNIOR 6+ syrop dla dzieci powyżej 6 roku życia syrop 120 ml

MINI 6m+ krople dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia krople 20 ml

SUPLEMENTY DIETY

Zatogrip MD Gardło Spray 3+

spray 30 ml

NOWOŚĆ



ZATOGRIPO MD Gardło Spray 3+ to wyrób medyczny w postaci sprayu zawierający m.in. PVP (*poliwinylopirolidon*), tyndalizowane (niezdolne do życia) bakterie kwasu mlekowego *Lactobacillus rhamnosus*, glicerynę, ksylitol, który powleka błonę śluzową jamy ustnej i gardła tworząc ochronny film. Dzięki działaniu nawilżającemu utrzymuje elastyczność błon śluzowych, co skutecznie łagodzi podrażnienia oraz dyskomfort związany z suchością w jamie ustnej. Zatogrip MD Gardło Spray ogranicza kolonizację drobnoustrojów patogennych, dzięki czemu zapewnia lepsze warunki do regeneracji błony śluzowej i przyspiesza przywrócenie fizjologicznej flory jamy ustnej i gardła. Wyrób medyczny utrudnia przyleganie bakterii do powierzchni składowi zębów, a tym samym zmniejsza ryzyko powstawania próchnicy. Zatogrip MD Gardło Spray można stosować profilaktycznie u osób, które narażone są na działanie drażniących czynników zewnętrznych np. klimatyzacja, zanieczyszczone powietrze, dym nikotynowy. Preparat o odświeżającym malinowo-miętowym smaku. Ostrzeżenie: Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia przeniesienia infekcji zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę. W celu zachowania właściwości wyrobu nie należy manipulować aplikatorem (nie ścisnąć, nie odgryzać). Nie aplikować preparatu w pozycji leżącej, ze względu na niebezpieczeństwo zakrztuszenia. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, powinna przed zastosowaniem tego wyrobu poradzić się lekarza lub farmaceuty. W przypadku dzieci powyżej 3 roku życia wyrób medyczny powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej. Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEKAM Sp. z o.o.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Zatogrip PLUS

płyn 120 ml



Zatogrip Plus płyn, 120 ml Produkt w płynie o smaku malinowym dla dzieci powyżej 3. roku życia. To aż 8 ekstraktów roślinnych. Bogaty skład Zatogrip Plus oprócz ekstraktów z kwiatów lipy szerokolistnej zawiera ekstrakty z owoców i kwiatów bzu czarnego, ziela tymianku właściwego, korzenia prawoślazu lekarskiego, owoców aceroli oraz ziela werbeny pospolitej, kwiatów dzianiny drobnokwiatowej, liści bluszczu pospolitego i dodatkowo cynk. To naturalna siła standardyzowanych ekstraktów roślinnych. Składniki suplementu diety Zatogrip Plus w synergicznym sposób wspomagają organizm w sezonie jesienno-zimowym.

SKŁADNIKI Woda, miód nektarowy wielokwiatowy, ekstrakt gęsty z owoców bzu czarnego (*Sambucus nigra*), ekstrakt z owoców bzu czarnego (*Sambucus nigra*), ekstrakt z kwiatów lipy szerokolistnej (*Tilia platyphyllos*), ekstrakt z ziela tymianku właściwego (*Thymus vulgaris*), ekstrakt z korzenia prawoślazu lekarskiego (*Althaea officinalis*), ekstrakt z owoców aceroli (*Malpighia punicifolia*), ekstrakt z kwiatów bzu czarnego (*Sambucus nigra*), mioczan cynku (cynk), naturalny aromat malinowy, ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (*Verbena officinalis*), substancja konserwująca – sorbinian potasu, ekstrakt z kwiatów dzianiny drobnokwiatowej (*Veronica officinalis*), ekstrakt z liści bluszczu pospolitego (*Hedera helix*), regulator kwasowości – kwas askorbinowy, kwas cytrynowy.

Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEKAM Sp. z o.o.

SUPLEMENT DIETY

Procto... co? Sposób na Proctomina! hemoroidy!



Proctomina • *Suppositoria anthemorrhoidales* FP • *Bismuthi subgallois* • *Zinci oxidum* • *Tinimum* 200 mg • 100 mg • 150 mg • Czopki, 10 sztuk. Wskazania: lek o działaniu ściągającym, stosowany w leczeniu doległości takich jak: ból, świąd, towarzyszący chorobie hemoroidalnej (guzkom krwawnym). Lek łagodzi stany zapalne oraz podrażnienia błony śluzowej odbytu. Skład: 1 czopek zawiera 200 mg bismutu galusianu zasadowego; 100 mg cynku tlenku; 150 mg tanniny oraz substancję pomocniczą: tłuszcz stępy. Podmiot odpowiedzialny: Farmina sp. z o.o., ul. Lipska 44, 30-721 Kraków.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

KIEDY CZUJESZ SIĘ NIEWYRAŹNIE
I KAŻDEGO DNIA DLA WSPARCIA ODPORNOŚCI

Rutinoscorbin
210 tabletek
150 tabletek

LEK + NIE SUPLEMENT

Rutinoscorbin, 25 mg + 100 mg, tabletki powlekane. 1 tabletka zawiera 25 mg rutyny (Rutinoscorbin) – w postaci rutynydoz trihydroksy i 100 mg kwasu askorbinowego (kwasu askorbinowego). Wskazania do stosowania: W stanach niedoboru kwasu askorbinowego. W stanach zwiększonego zapotrzebowania na kwas askorbinowy (przebiegiem, zakażenia wirusowe w tym grypa). Pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń. Produkt Rutinoscorbin jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i dzieci w wieku 14 lat i starszych. Podmiot odpowiedzialny: Haloń Poland Sp. z o.o., 29.11.2023. PM-PL-OTR-24-00112

TO JEST LEK. DLA BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ GO ZGODNIE Z ULOTKĄ DOŁĄCZONĄ DO OPAKOWANIA. NIE PRZEKRAŻAJ MAKSYMALNEJ DAWKI LEKU. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ.

MARKA NR 1 W PIELEGNACI PROTEZ ZĘBOWYCH NA ŚWIECIE

COREGA

Super Mocny Delikatnie Miętkowy
Super Mocny Neutralny Smak
EKONOMICZNE OPAKOWANIE XL

*Wartość w cenach detalicznych dla produktów CSK + Kategorii Produktów do Pielegnacji Protez Zębowych, dane za okres październik 2021 - wrzesień 2022. Kiem do mocowania protez zębowych Corega Super Mocny Delikatnie Miętkowy 40 g Neutralny Smak 70 g. Wyprodukowane przez: Stafford-Miller (Ireland) Limited. Podmiot prowadzący reklamę: Haloń Poland Sp. z o.o. PM-PL-PID-24-00036

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA LUB ETYKIETĄ.

Voltaren MAX
Diclofenacum diethylammonium 232 mg/g, żel
100 g

gsk

Voltaren MAX, 232 mg/g, żel
1 gram produktu Voltaren MAX zawiera 232 mg diklofenaku dietyloamoniowego (Diclofenacum diethylammonium), co odpowiada 20 mg diklofenaku sodowego. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każdy gram żelu zawiera 50 mg glikolu propylenowego, 0,2 mg butylohydroksytoluenu (E 321) oraz 1 mg kompozycji zapachowej. Wskazania do stosowania: Voltaren MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: Dorosli i młodzież powyżej 14 lat: - porażonych stanów zapalnych ścięgien, więzideł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrżzeń lub stłuczeń), - bóli pleców, - ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie tendyni stawowej, zapalenie okostnowe. Dorosli (powyżej 18 lat): - ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.1.2023

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

OTRIVIN
10 ml

ZACZYNA UDROŻNIAĆ NOS W 2 MINUTY
DZIAŁA DO 12h

Otrivin, 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór. Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazyny chlorowodorku (Xylometazolinum hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek. Każda dawka aerozolu zawiera 0,04 mg chloru benzalkoniowego, co odpowiada 0,1 mg chloru benzalkoniowego w 1 ml roztworu. Wskazania do stosowania: Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Produkt leczniczy ułatwia oddychanie w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Dzięki zmniejszeniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Produkt ułatwia wmiękanie nosa. Otrivin jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.1.2022

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

BUDUJ ODPORNOŚĆ CAŁEJ RODZINY KAŻDEGO DNIA

ecomer GOLD
SUPPLEMENT DIET
60 tabletek

ecomer
SUPPLEMENT DIET
60 tabletek

SUPLEMENTY DIETY ZAWIERAJĄCE OLEJ Z WĄTROBY REKINA, DLA DZIECI POWYŻEJ 3. ROKU ŻYCIA I DOROSŁYCH.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut różnicowanej diety. Produkty marki ecomer® dostępne w aptekach i drogeriach aptecznych.

AMARA®

OTRIVIN MENTHOL
10 ml

Otrivin Menthol
1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór
Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazyny chlorowodorku.
Jedna dawka aerozolu zawiera 0,14 mg ksylometazyny chlorowodorku.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
2,75 mg/ml makropolioglicerolu hydroksystearnian (olej rybcynowy uwodniony polioksylenowany).
Wskazania do stosowania:
Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok.
Produkt leczniczy ułatwia oddychanie w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Dzięki zmniejszeniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Produkt ułatwia wmiękanie nosa. Otrivin Menthol jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.1.2023

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

IMMUNOTROFINA®
płyn 200 ml

IMMUNOTROFINA®
Płyn 200 ml
Suplement diety

Immunotrofina
Syrop na odporność

Immunotrofina zawiera składniki, które pełnią wiele ważnych funkcji w organizmie, biorąc udział w różnych procesach fizjologicznych i pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Przyjmowanie preparatu Immunotrofina jest polecane w przypadku potrzeby suplementacji tych składników lub zwiększonego zapotrzebowania na nie.

Immunotrofina, płyn, suplement diety.
Opakowanie: Butelka 200 ml z miarką wyskalowaną od 2,5 ml do 10 ml.
Zalecane spożycie: Dzieci powyżej 3. roku życia 5 ml, dzieci powyżej 6. roku życia i dorośli 10 ml raz dziennie, najlepiej pomiędzy posiłkami.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut różnicowanej diety.
Stosowanie zbilansowanej diety i prowadzenie zdrowego trybu życia jest niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
Wyłączny dystrybutor na Polskę: Vitamed Pharmaceuticals Sp. z o.o., www.vitamed.pl

GASTROTUSS®
syrop w saszetkach 20 x 20 ml

GASTROTUSS®
SYROP PRZECIWREFLUKSWY
20 x 20 ml

Gastrotuss syrop przeciwrefluksowy

Szybko uwalnia od zgagi i innych objawów refluksu.
Zapobiega cofaniu treści pokarmowej z żołądka do przełyku.
Chroń przełyk przed podrażnieniem.
Odpowiedni również w terapii przewlekłej.

Gastrotuss, syrop przeciwrefluksowy, wyrób medyczny.
Opakowanie: Syrop: 20 saszetek po 20 ml, butelka 200 ml z miarką.
Sposób użycia i dawkowanie: Dorosli i dzieci powyżej 12. roku życia: Jeśli lekarz nie zaleci inaczej 20 ml lub jedna saszetka (20 ml) po głównych posiłkach i przed snem.
Producent: DMG Italia s.r.l.
Podmiot prowadzący reklamę i wyłączny dystrybutor na Polskę: Vitamed Pharmaceuticals Sp. z o.o., www.vitamed.pl

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykiety.

Informacje na temat preparatów prezentowanych w informatorze: tel. 71 715 62 81. Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej zgodnie z art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i innych stosownych przepisów. Določono wszelkich starań aby uniknąć ewentualnych błędów. Informator wydany na zlecenie producentów przez Halo-Farm, halo.kontakt@gmail.com

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.